

## Vorkurs Mathematik: Arbeitsblatt 2

---

### Aufgabe 2.1

Kürzen Sie die folgenden Brüche (**ohne** Zuhilfenahme elektronischer Hilfsmittel). Geben Sie ggf. die Werte der Variablen an, für die der gegebene Bruch definiert ist.

a)  $\frac{64}{24}$ ,

b)  $\frac{63a^2b}{14ab^2}$ ,

c)  $\frac{3(x^2 - y^2)}{6y - 6x}$ ,

d)  $\frac{a^2 - 2ab + b^2}{3a - 3b}$ ,

e)  $\frac{63a^2b^2 - 9ab}{18ab + 27a^2b^2}$ ,

f)  $\frac{1 + \frac{1-n}{n(n+3)}}{n+1}$ ,

g)  $\frac{q^3 - 1}{q - 1}$ ,

h)  $\frac{\frac{a}{1-a} + \frac{a+1}{a}}{\frac{a-1}{a} - \frac{a}{a+1}}$ .

### Aufgabe 2.2

Berechnen Sie die folgenden Brüche (**ohne** Zuhilfenahme elektronischer Hilfsmittel), und kürzen Sie dann so weit wie möglich. Geben Sie ggf. die Werte der Variablen an, für die der gegebene Bruch definiert ist.

a)  $1 + \frac{1}{2} - \frac{1}{3} + \frac{1}{5} - \frac{1}{6} + \frac{1}{15}$ ,

b)  $\frac{1 + \frac{2}{3}}{2 - \frac{4}{5}}$ ,

c)  $\frac{10}{7} \cdot \frac{9}{2} \cdot \frac{28}{3}$ ,

d)  $\frac{x}{-x - 2y} + \frac{y}{x + 2y}$ ,

e)  $\frac{1}{2} : \frac{1}{4}$ ,

f)  $\frac{a^2 + b^2}{a^2 - b^2} : \frac{a + b}{a - b}$ ,

g)  $\frac{3a}{6ab} - \frac{7b}{3a} + \frac{2ab}{4}$ ,

h)  $\frac{x(1-x)}{\sqrt{1-x^2}} - \sqrt{1-x^2}$ .

### Aufgabe 2.3

Lösen Sie die folgenden Ungleichungen, und geben Sie die Lösungsmenge an.

a)  $4x + 3 \leq 2(x - 6)$ ,

b)  $\frac{x-1}{2} \geq \frac{1-x}{3}$ ,

c)  $4(1-x) + 3(x+2) < 8$ ,

d)  $3x - 1 \leq 2(x - 3) - (2 - x)$ ,

e)  $9x \geq \frac{3(6x-1)}{2}$ ,

f)  $7x \leq \frac{3(x-1)}{-2}$ .

### Aufgabe 2.4

Welche Ungleichungen sind richtig/falsch, bzw. für welche Werte  $a$  sind sie erfüllt?

a)  $3^{-\frac{1}{2}} < \left(\frac{1}{2}\right)^{\frac{1}{2}}$ ,

b)  $(1+a)^2 \leq 1+2a$ ,  $a \in \mathbb{R}$ ,

c)  $a^2 > 2$ ,  $a \in \mathbb{Z}$ ,

d)  $\left(\frac{1+a}{a}\right) > \left(\frac{a}{a-1}\right)$ ,  $a \in \mathbb{R}$ ,  $a > 1$ .

### Aufgabe 2.5

Beweisen Sie die folgende Aussage:

$$\forall y \in \mathbb{R} \exists x \in \mathbb{R}_{>0} : y = x - \frac{1}{x}.$$

**Aufgabe 2.6**

Zeigen Sie, daß das Quadrat jeder ungeraden Zahl wieder ungerade ist.

**Aufgabe 2.7**

Seien  $A, B$  Mengen. Beweisen Sie die folgende Aussage:

$$(A \subseteq B) \Leftrightarrow (A \cup B = B) \Leftrightarrow (A \cap B = A) \Leftrightarrow (A \setminus B = \emptyset).$$

Zum Abschluß eine Aufgabe zum Grübeln! Versuchen Sie dennoch, auch einen formalen Beweis herzuleiten.

**Aufgabe 2.8**

Sei  $n \in \mathbb{N}$  und  $M$  eine  $(n + 1)$ -elementige Teilmenge von  $\{1, 2, \dots, 2n\}$ . Zeigen Sie, daß  $a, b \in M$  mit  $a \neq b$  und  $a$  teilt  $b$  existieren.

Hierbei heißt „ $a$  teilt  $b$ “, daß ein  $k \in \mathbb{N}$  existiert mit  $k \cdot a = b$ .